


モンゴル・中国における海外安全対策セミナー

PM_{2.5}をはじめとする 大気汚染の健康影響


2014年10月

兵庫医科大学公衆衛生学

島 正之




本日お話しする主な内容




- PM_{2.5}の特徴と健康影響の種類
- 欧米諸国における疫学研究
 - 短期曝露による影響
 - 長期曝露による影響
- 日本における知見
- 中国における知見
- 環境基準と高濃度時の対策

ロンドンスモッグ事件

(1952年12月)




- 石炭暖房による高濃度二酸化硫黄の発生
- 2週間で約4,000名の過剰死亡(その後の影響を含め8,000名)
- 特に、気管支炎による死亡の増加、心疾患のある人への影響が大



出典：Wilkins E.T. „Air pollution and the London fog of December, 1952.
J.Royal. Sanitary Institute. 74(1):1-21(1954)

粒子状物質の定義



- 浮遊粒子状物質

Suspended Particulate Matter (SPM)

- 大気中に比較的長く浮遊し、呼吸器系に吸入される粒径 $10\mu\text{m}$ 以下の粒子

- 微小粒子状物質($\text{PM}_{2.5}$)

- 粒子状物質の中でも粒径 $2.5\mu\text{m}$ 以下の微小なもの
- 呼吸器系の深部まで到達しやすく、粒子表面に様々な有害成分が吸収・吸着されていること等から健康影響が懸念されている。









Image courtesy of EPA, Office of Research and Development

大気中粒子状物質の粒径分布




(Whitby. Atmos Environ, 12:135-59, 1978)



粒子状物質の呼吸器への沈着




(ISO, 1981)




粒子の大きさと呼吸器への沈着



微小粒子(PM_{2.5})の健康影響



- 米国東部6都市の住民約8,000人を14～16年にわたって追跡調査
- 年齢、性、喫煙、職業等を調整した死亡率は、大気汚染レベルの高い都市ほど高く、各都市のPM_{2.5}濃度との間に強い関連が認められた。



(Dockery DW, et al. N Engl J Med, 329: 1753-1759, 1993)



大気汚染、粒子状物質に発がん性がある (Group 1) と認定 (2013年10月)。

17 October 2013


IARC: Outdoor air pollution a leading environmental cause of cancer deaths

Lyon/Geneva, 17 October 2013 – The specialized cancer agency of the World Health Organization, the International Agency for Research on Cancer (IARC), announced today that it has classified outdoor air pollution as *carcinogenic to humans* (Group 1).

After thoroughly reviewing the latest available scientific literature, the world's leading experts convened by the IARC Monographs Programme concluded that there is *sufficient evidence* that exposure to outdoor air pollution causes lung cancer (Group 1). They also noted a positive association with an increased risk of bladder cancer.

Particulate matter, a major component of outdoor air pollution, was evaluated separately and was also classified as *carcinogenic to humans* (Group 1).

The IARC evaluation showed an increasing risk of lung cancer with increasing levels of exposure to particulate matter and air pollution. Although the composition of air pollution and levels of exposure can vary dramatically between locations, the conclusions of the Working Group apply to all regions of the world.




国際がん研究機関の発がん性分類

グループ	発がんリスク	主な物質	種類
1	発がん性がある	アスベスト、ダイオキシン、放射線、喫煙、受動喫煙、アルコール、ラドン、太陽光、 大気汚染、粒子状物質	114
2A	おそらく発がん性がある	熱いマテ茶、鉛化合物、石油精製業、理容師・美容師、シフト勤務	69
2B	発がん性があるかもしれない	コーヒー、漬物、わらび、携帯電話の電磁波、超低周波磁界、ガソリン	283
3	発がん性がある と分類できない	カフェイン、お茶、髪染料、水銀	504
4	おそらく発がん性はない	カプロラクタム（ナイロンの原料）	1


(IARC. Last update: 25 July 2014)

大気汚染の健康影響の程度





(WHO Air Quality Guidelines: Global Update 2005)

微小粒子(PM_{2.5})の健康影響




- 1990年代以降、諸外国で、大気中微小粒子状物質(PM_{2.5})と呼吸器・循環器系疾患による受診、入院、死亡との関係が示され、近年は虚血性心疾患に及ぼす影響が注目されている。
- 日本でも、PM_{2.5}濃度と呼吸器疾患による日死亡、喘息児の症状増悪などとの関連が認められている。

大気汚染物質の健康影響 に関する研究のデザイン



(Holgate et al. Ed., Air Pollution and Health, 1999)


PM_{2.5}短期曝露と死亡の関連



- PM_{2.5}濃度が上昇すると、当日または数日以内に死亡する人が増加するという関連が報告されている。
- PM_{2.5}日平均濃度10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 上昇あたりの増加
 - 全死亡(外因死を除く) 0.3~1.2%
 - 心血管系疾患による死亡 1.2~2.7%
 - 呼吸器系疾患による死亡 0.8~2.7%
- こうした関連性は、PM_{2.5}の日平均濃度が12.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以上の場合に観察されている。

(U.S. EPA. 2012)


呼吸器疾患による入院・救急受診



- PM_{2.5}への短期的曝露により、呼吸器疾患による救急受診や入院が増加することが報告されている。
- 慢性閉塞性肺疾患（COPD）や呼吸器感染症による受診や入院は、PM_{2.5}の日平均値が6.1～22.0μg/m³程度で観察されている。
- 喘息による受診や入院との関連も多くの研究で認められているが、小児については必ずしも一致した結論は得られていない。

(U.S. EPA. 2012)


肺機能の変化



- ピークフロー値（最大呼気流量）等の肺機能の日単位の変化との関連が検討されている。
 - 喘息患者を対象とした研究
 - ピークフロー値はPM_{2.5}濃度が増加すると有意に低下するものが多い。
 - 1秒量についても同様の関連が認められている。
 - 喘息患者以外（健常者）を対象とした研究
 - 報告数は少なく、明らかな関連性を認めていないものが多い。
- ピークフロー値（PEF）：できるだけ早く息を吐き出す速度（最大呼気流量）
- 1秒量（FEV₁）：努力呼出の開始から1秒間に呼出した空気量

(U.S. EPA. 2012)


呼吸器症状の変化



- 喘息または慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者を対象として、咳、痰、呼吸困難、喘鳴、気管支拡張剤の使用などの日単位の変化との関連性が検討されている。
- ピークフロー値でみられたような有意な関連性は認めていない報告が多いが、影響を示唆したものもある。

(U.S. EPA. 2012)


循環器疾患による入院・救急受診



- PM_{2.5}への曝露と循環器疾患（主に虚血性心疾患、うっ血性心不全）による救急受診や入院の増加との関連が多数報告されている。
 - 日平均値が7.0～18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 程度で認められる。
- PM_{2.5}への短期的な曝露と脳卒中の発症との関連も示されている。
 - 脳梗塞発症リスクは日平均値が15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以上では15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満の日よりも34%増加する。

(U.S. EPA. 2012)



長期曝露の死亡への影響



- 死亡をエンドポイントとした長期曝露影響は、主にコホート研究によって検討されている。
- 米国ハーバード6都市研究
 - 約8,000人を14～16年間追跡
 - 都市別の死亡率は、大気中のPM_{2.5}及び硫酸塩濃度との関連が強い。
 - PM_{2.5}濃度と全死亡、循環器・呼吸器疾患による死亡との間に有意な正の関連がみられた。
 - 観察期間を8年間延長しても同様の結果であった。
 - この間のPM_{2.5}濃度の改善が全死亡の減少と関連があった。

微小粒子と死亡(全死因)との関連

米国6都市調査




太字: 第1期(1980-1985年), 斜体字: 第2期(1990-1998年)

(Laden, et al. Am J Respir Crit Care Med 173: 667-672, 2006)

小児の肺機能の成長と大気汚染


南カリフォルニア12地域の小児(約1700名)を対象に、10～18歳まで肺機能を毎年測定し、大気汚染との関係性を評価した。

1秒量(FEV_1)の年間成長率と大気汚染の関係



(Gauderman, et al. Am J Respir Crit Care Med 166:76-84, 2002)

1秒量(FEV₁)の年間成長率 最高汚染地区と最低汚染地区の差(%)





Pollutant [‡]	More Outdoors [†]		Less Outdoors	
	%	Difference in Growth [‡] (95% CI)	%	Difference in Growth (95% CI)
O ₃ , 10 A.M.–6 P.M.	−0.83	(−1.66, 0.00)	−0.35	(−1.25, 0.56)
NO ₂	−0.82	(−1.56, −0.08)*	−0.21	(−1.03, 0.61)
Acid vapor	−1.01	(−1.65, −0.38)***	−0.31	(−1.11, 0.49)
PM ₁₀	−0.63	(−1.60, 0.35)	0.20	(−0.80, 1.21)
PM _{2.5}	−0.80	(−1.51, −0.08)*	−0.01	(−0.86, 0.84)
EC	−0.74	(−1.44, −0.03)*	−0.09	(−0.87, 0.71)

屋外で過ごす時間が長いほうが肺機能の成長に対する
大気汚染の影響が大きい。

(Gauderman, et al. Am J Respir Crit Care Med 166:76-84, 2002)

肺機能と喘息発症との関係


(カリフォルニア小児研究での8年間追跡)



HR(ハザード比): 肺機能高値者の、低値者に対する喘息罹患の比

(Islam, et al. Thorax 62:957-963, 2007)


PM_{2.5}の健康影響(米国EPA, 2010)



曝露期間	健康影響	因果関係
長期曝露	死亡	明確
	心血管系	明確
	呼吸器系	ほぼ明確
	生殖・発達	示唆
	発がん、変異原性、遺伝毒性	示唆
短期曝露	死亡	明確
	心血管系	明確
	呼吸器系	ほぼ明確
	中枢神経系	不十分


微小粒子状物質曝露影響調査

環境省(2007年7月)




- 短期曝露の影響
 - 日死亡との関連
 - 呼吸器系への影響
 - 喘息による夜間急病診療所の受診
 - 気管支喘息児(入院児)のピークフロー値
 - 気管支喘息児(通院児)のピークフロー値
 - 小学生のピークフロー値及び1秒量
 - 循環器系への影響
 - 埋め込み型除細動器による治療の発生
- 長期曝露の呼吸器系への影響

環境省の健康影響調査結果の概要



調査項目		評価	主な結果
微小粒子状物質曝露影響調査			
短期的影響			
死亡	総死亡	△	PM _{2.5} 濃度の上昇により死亡リスクがわずかに増加
	呼吸器系	○	3日前のPM _{2.5} 濃度の上昇により有意に増加
	循環器系	×	当日～5日前のPM _{2.5} 濃度との関連なし
疾病	喘息による受診	×	喘息による急病診療所受診とPM _{2.5} 濃度との関連なし (オゾン濃度とは関連あり)
	呼吸器系	○	PM _{2.5} 濃度の上昇により喘息児、小学生のピークフロー値が有意に低下
	循環器系	×	SPM濃度と心室性不整脈との関連なし
長期的影響	呼吸器系	△	保護者の持続性の咳・痰はPM _{2.5} 濃度が高い地域ほど高率だが、小児の呼吸器症状とは関連なし
粒子状物質による長期曝露影響調査			
長期的影響	総死亡	×	大気汚染との関連なし
	肺がん	○	喫煙等を調整した後でSPM濃度と正の関連あり
	呼吸器系	△	女性では二酸化硫黄、二酸化窒素濃度と有意な関連あり (SPM濃度との関連は有意ではない)
	循環器系	×	SPM濃度と負の関連あり(血圧などのリスク因子未調整)


ピークフロー値との関連




気管支喘息児（入院児）

- 千葉県の病院に長期間入院している小児気管支喘息患者17名（平均11.4歳）
- 毎日午前7時と午後7時にピークフロー値を測定
- PM_{2.5}濃度は病院近傍の大気環境測定局で測定
- ピークフロー値とPM_{2.5}濃度の関連を検討
 - 性，年齢，身長，気温の影響を調整
 - PM_{2.5}濃度が10 µg/m³増加したときのピークフロー値の変化量で示した。


ピークフロー値変化量



24時間前～測定時の
1時間平均PM_{2.5}濃度
10 µg/m³増加あたり




16時以降のPM_{2.5}
濃度が増加すると、
当日夜と翌日朝の
ピークフロー値の
低下が認められた。




(Yamazaki, Shima, et al. Environmental Health, 10:15, 2011)

ピークフロー値との関連(要約)



- 気管支喘息児(入院児)
 - 午後4時以降の大気中PM_{2.5}濃度の上昇により、当日夜と翌日朝のピークフロー値の有意な低下が観察された。
- 水泳教室に通う喘息児
 - 温暖期に起床時のピークフロー値の低下と大気中SPM濃度との関連がみられた。
- 小学生(健常児)
 - 夜間の肺機能値は、測定前の一部の時間帯の大気中PM_{2.5}濃度が高いとわずかな低下が認められたが、喘息児に比べて、その程度は小さかった。



微小粒子状物質(PM_{2.5})の喘息に与える短期的影響



- 対象
 - 長期にわたって入院中の小児気管支喘息患者19名(8～15歳)
- 方法
 - 毎日、朝(午前6時)と夜(午後7時)に肺機能を測定し、看護師により喘鳴の有無を確認した。
 - PM_{2.5}濃度は、病院内(病室)、病院外(玄関)、病院に近接する一般環境大気測定局で測定
 - ピークフロー値(PEF)及び喘鳴症状とPM_{2.5}濃度との関連を解析した。

(Ma, Shima, et al. J Epidemiol, 18: 97-110, 2008)


期間中のPM_{2.5}濃度及び 喘鳴症状有症率の推移



(Ma, Shima, et al. J Epidemiol, 18: 97-110, 2008)

PM_{2.5}濃度とPEF変化との関連

PM_{2.5} 10 µg/m³増加あたりの変化量(L/min)




	Change [*]	95% CI		p値
<i>PEF in morning</i>				
院内 PM _{2.5}	−2.86	−4.12	−1.61	<0.001
院外 PM _{2.5}	−1.34	−2.99	0.32	0.113
測定局 PM _{2.5}	−0.35	−1.89	1.20	0.662
<i>PEF in evening</i>				
院内 PM _{2.5}	−3.59	−4.99	−2.20	<0.001
院外 PM _{2.5}	−3.40	−6.47	−0.33	0.030
測定局 PM _{2.5}	−1.38	−3.84	1.08	0.271

* 性、年齢、身長、期間中の成長、気温、相対湿度の影響を調整

(Ma L, Shima, et al. J Epidemiol, 18: 97-110, 2008)

PM_{2.5}濃度と喘鳴との関連

24時間平均濃度の4分位別オッズ比




	朝			夜		
	オッズ比*	95%信頼区間		オッズ比*	95%信頼区間	
院内PM _{2.5} (24時間平均)(μg/m ³)						
<11.0	1.00			1.00		
11.0–15.3	1.05	0.99	1.12	1.10	1.04	1.16
15.4–27.9	1.09	1.03	1.15	1.14	1.05	1.23
≥28.0	1.08	1.02	1.14	1.22	1.10	1.35
測定局PM _{2.5} (24時間平均)(μg/m ³)						
<13.9	1.00			1.00		
13.9–18.1	1.03	0.96	1.10	1.01	0.96	1.07
18.2–23.5	1.02	0.96	1.08	1.06	1.02	1.11
≥23.6	1.01	0.95	1.09	1.09	1.03	1.16

* 性、年齢、気温、相対湿度の影響を調整

(Ma L, Shima, et al. J Epidemiol, 18: 97-110, 2008)


長期曝露の死亡への影響



● 3府県コホート研究

- 宮城県、愛知県、大阪府で、それぞれ都市地区と対照地区の40歳以上の男女約10万人を対象
- 1983～85年から10～15年間追跡
- 全死亡、循環器及び呼吸器系疾患による死亡はSPM濃度との関連はみられない(負の関連あり)。
- 肺がん死亡は、男性及び男女計でSPM濃度との間に有意な正の相関がみられた。
- 相対リスク(95%信頼区間)
 - SPM濃度 $10\mu\text{g}/\text{m}^3$ 増加あたり 1.16 (1.08-1.25)
PM_{2.5}濃度に換算すれば、1.24 (1.12-1.37)

「中国における都市大気汚染による健康 影響と予防対策に関する国際共同研究」 (国立環境研究所特別研究:2000～2004年度)




- 中国東北地方遼寧省の3都市において、大気中粒子状物質に注目し、その実態と住民の曝露状況及び健康影響を明らかにし、予防対策に寄与することを目的とした。
- その一環として、小学生を対象に年4回の肺機能測定を行い、大気中粒子状物質濃度との関連を検討した。

中国医科大学公共衛生学院、瀋陽市、撫順市、鉄嶺市疾病預防控制中心(CDC)との共同研究として実施






(国立環境研究所特別研究報告SR-64-2005)

調査対象の3都市





(国立環境研究所「環境儀」No.21, 2005)

各都市の大気中粒子状物質濃度



(国立環境研究所特別研究報告SR-64-2005)


粒子状物質の家屋内外及び 個人曝露濃度(瀋陽、2002年)



(国立環境研究所特別研究報告SR-64-2005)



大気中PM_{2.1}濃度とFEV₁との関連

PM_{2.1}濃度10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 増加あたりのFEV₁変化量(Liter)



男子



女子




(a-i:学校名、T1, T2, T3: 各都市計、TT: 3都市計)

(国立環境研究所特別研究報告SR-64-2005)


家屋内外PM₁₀濃度と近傍測定局における濃度(2008～2009年、北京)



北京の大気汚染と小児の気道炎症




- 北京の小学生36名を対象として、2007～2008年に気道炎症の指標である呼気一酸化窒素(NO)濃度が繰り返し測定された(のべ1,581回)。
- オリンピック開催期間中は大気汚染濃度が低く、呼気NO濃度も低いことが示された。





(Lin, et al. Environ Health Perspect 119:1507–1512, 2011)

北京の大気汚染と小児の気道炎症




小学生の呼気一酸化窒素(NO)濃度は、検査前(0-24時間、25-48時間)のPM_{2.5}、BC濃度が増加すると、有意に高くなることが示された。



(Lin, et al. Environ Health Perspect 119:1507–1512, 2011)

PM_{2.5}に係る環境基準



疫学研究

毒性学研究

曝露評価

様々な健康影響(呼吸器・循環器系疾患、肺がん等)


微小粒子状物質に係る環境基準等

	日本	中国	米国	WHO
1日平均	35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ *	75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ **	35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
年平均	15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ *	35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ **	12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ***	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* 日本のPM_{2.5}の環境基準は2009年9月告示

** 中国のPM_{2.5}の環境基準は2012年2月設定。北京・天津・河北、長江デルタ、珠江デルタ等の重点地域、直轄市及び省都の計74都市で2012年末から実施、2016年1月～全国施行。

*** 米国のPM_{2.5}の環境基準(年平均)は2012年12月改訂




注意喚起のための暫定的な指針

レベル	暫定的な指針 となる値	行動の目安
	日平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
Ⅱ	70超	不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。 (高感受性者においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれる。)
I	70以下	特に行動を制約する必要はないが、高感受性者では健康への影響がみられる可能性があるため、体調の変化に注意する。
(環境基準)	35以下	

高感受性者は、呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等。


環境省「微小粒子状物質(PM_{2.5})に関する専門家会合」、平成25年2月

「暫定的な指針」を超える場合




- PM_{2.5}の1日平均値が70 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えると予想される場合は、都道府県等から注意喚起が行われる。
- その場合、屋外での長時間の激しい運動を控えることが推奨される。屋内でも換気や窓の開閉を最小限にし、外気の侵入を少なくすることが望ましい。
- ただし、この値を大きく超えない限り、健康な人に影響がみられるわけではないので、運動会等の屋外での行事を中止する必要はない。
 - 「大きく超える場合」とは？
十分な科学的知見はないが、米国の大気質指数(Air Quality Index)では、150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超える場合に「すべての人はあらゆる屋外活動を中止するべき」としている。

米国の大気質指数(AQI)




AQI	PM _{2.5} 日 平均値	区分	健康影響	健康保護アドバイス
0-50 (緑)	0-12 μg/m ³	良好 (Good)	大気環境は良好で、危険性はほとんど又はまったくない。	
51-100 (黄)	13-35 μg/m ³	中程度 (Moderate)	大気汚染度は許容範囲だが、一部の人の健康に影響を与える可能性がある。	・特に敏感な人は、長時間又は激しい屋外活動の減少を控えるよう心がけるべき。
101-150 (橙)	36-55 μg/m ³	敏感な人に影響 (Unhealthy for Sensitive Group)	一般成人は健康に影響を及ぼすおそれはないが、心臓・肺疾患患者、高齢者及び子供は、リスクが増える。	・心臓・肺疾患患者、高齢者及び子供(高リスクの人)は、 <u>長時間又は激しい屋外活動を控えるべき。</u>
151-200 (赤)	56-150 μg/m ³	健康に悪影響 (Unhealthy)	すべての人に、ある程度の健康への影響を与える可能性があり、敏感な人にはより深刻な影響を与える可能性がある。	・高リスクの人は、 <u>あらゆる屋外活動を中止するべき。</u> ・すべての人は、 <u>長時間又は激しい屋外活動を控えるべき。</u>
201-300 (紫)	151-250 μg/m ³	健康に極めて悪影響 (Very Unhealthy)	健康に関する注意報: すべての人に対し、健康により深刻な影響を与える可能性がある。	・高リスクの人は、 <u>屋内に留まり、活動を少なくにするべき。</u> ・すべての人は、 <u>あらゆる屋外活動を中止するべき。</u>
301-500 (赤褐色)	251-500 μg/m ³	有害 (Hazardous)	健康に関する緊急警報: すべての人に対し、健康への影響を及ぼす可能性が高い。	

中国の大気質指数(AQI)



AQI	PM _{2.5} 日 平均値	区分	健康影響	健康保護アドバイス
0-50 (緑)	0-35 μg/m ³	優	汚染なし	・通常の活動が可能
51-100 (黄)	36-75 μg/m ³	良	特に敏感な人に対して軽い影響	・特に敏感な人は、屋外活動を控えるよう心がけるべき。
101-150 (橙)	76-115 μg/m ³	軽度汚染	敏感な人は症状が悪化。健康な人にも刺激症状が現れる。	・心臓・肺疾患患者、高齢者及び子供(高リスクの人)は、 <u>長時間又は激しい屋外活動を控えるべき。</u>
151-200 (赤)	115-150 μg/m ³	中度汚染	敏感な人はさらに症状が悪化。健康な人も心臓や呼吸器に影響の可能性がある。	・高リスクの人は、 <u>長時間又は激しい屋外活動を中止するべき。</u> ・すべての人は、 <u>屋外活動を控えるべき。</u>
201-300 (紫)	151-250 μg/m ³	重度汚染	心臓病・呼吸器疾患の患者は症状が顕著に悪化、抵抗力が低下。健康な人にもすべて症状が現れる。	・高リスクの人は、 <u>屋外活動を中止して屋内に留まるべき。</u> ・すべての人は、 <u>あらゆる屋外活動を控えるべき。</u>
301-500 (赤褐色)	251-500 μg/m ³	嚴重汚染	健康な人も抵抗力が低下し、強烈な症状が見られ、疾病を早期に発症する。	・高リスクの人は、 <u>屋内に留まり、活動を少なくするべき。</u> ・すべての人は、 <u>あらゆる屋外活動を中止するべき。</u>




AQIと各汚染物質濃度の関係(中国)

大気質 分指数 (IAQI)	各汚染物質濃度の値									
	二酸化 硫黄 (SO ₂): 24時間 平均 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	二酸化 硫黄 (SO ₂): 1時間平 均 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	二酸化 窒素 (NO ₂): 24時間 平均 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	二酸化 窒素 (NO ₂): 1時間平 均 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	粒子状 物質 (PM10): 24時間 平均 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	一酸化 炭素 (CO): 24時間 平均 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	一酸化 炭素 (CO): 1時間平 均 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	オゾン (O ₃): 1時間平 均 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	オゾン (O ₃): 8時間滑 動平均 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	微小粒 子状物 質 (PM2.5) 24時間 平均 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	50	150	40	100	50	2	5	160	100	35
100	150	500	80	200	150	4	10	200	160	75
150	475	650	180	700	250	14	35	300	215	115
200	800	800	280	1200	350	24	60	400	265	150
300	1600	—	565	2340	420	36	90	800	800	250
400	2100	—	750	3090	500	48	120	1000	—	350
500	2620	—	940	3840	600	60	150	1200	—	500

各汚染物質についての指数のうち、最も高い数値がAQIとなる。


→ **総合的な大気汚染指数**

高感受性者に対する注意




- 喘息などの呼吸器疾患、心臓病などの循環器疾患を有する人、乳幼児や高齢者はこれより低い濃度でも影響を生じる可能性がある。
- こうした人たちにおける影響は個人差が大きく、環境基準(1日平均値 $35\mu\text{g}/\text{m}^3$)より低い濃度であっても健康影響がみられることがある。
- 普段から健康管理を心がけ、体調の変化に注意することが望ましい。
 - 例えば、喘息の場合、せき、たん、呼吸困難などの呼吸器症状、ピークフロー値の変化などに注意

高濃度汚染時に注意すべきこと



- 大気汚染濃度に注意し、高濃度時は、不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
- 呼吸器や循環器に疾患のある方、小児、高齢者は、体調の変化に注意し、より慎重な行動が望まれる。
- 外出する場合は、マスクを着用する。
- 室内には必要に応じて空気清浄機を設置し、ドアや窓を閉め、風が通る隙間をふさぐ。
- 室内での禁煙など、他の汚染源にも注意する。


マスクの着用法




- 自分の顔に合った形状、サイズのマスクをあらかじめ探しておく。
- 子供は子供用のサイズを着用する。
- 鼻の両脇やあご、頬のラインに隙間のできないようにする。
- 着用後、空気が漏れる部分がないか確認する。
- 着ける場所、状況を選ぶ（通勤・通学、買い物）。
- マスク着用は保湿効果も期待でき、のどを守る。
- 慣れたからといってまったく着けないのは危険。
- 使い捨てのものを何度も使用しない。

空気清浄機の使用

- 部屋の大きさに合わせて選択する。
- 説明書に従い、フィルターの清掃、交換などをこまめに行う(清掃時にはマスクを着用)。





空気清浄機の使用と屋内外PM濃度比



家庭内喫煙とPM_{2.5}濃度

(スコットランドの家屋における24時間平均濃度)





喫煙者がいると家屋内のPM_{2.5}濃度は非常に高い。

- ◆ 喫煙者のいない家庭 8 µg/m³
- ◆ 一人でも喫煙者のいる家庭 71 µg/m³

(Osman, et al. Am J Respir Crit Care Med 176:465-472, 2007)



家屋内PM_{2.5}濃度(24時間平均) 屋内発生源別





喫煙者がいる家庭:平均143µg/m³平均(最大463µg/m³)

(Coggins, et al. Indoor Air Pollution and Health,
Environmental Protection Agency, Ireland. 2013)

PM_{2.5}の環境基準達成状況 (平成24年度)





PM_{2.5}濃度の年平均値の経年変化





資料:環境省(N=調査地点数)

中国のPM₁₀濃度(年平均値)の推移



中国統計年鑑より作成(環境省資料)


東京都内の浮遊粉じん濃度 (昭和39～43年)



(厚生省調べ:昭和44年版公害白書)

光化学オキシダント濃度の経年変化


昼間の日最高1時間値の年平均値



◆ 一般環境大気測定局 ■ 自動車排出ガス測定局

(資料: 環境省)



気管支喘息発作による受診への影響



- 対象：兵庫県姫路市の急病センター
 - 平日夜間に受診し、喘息と診断された112名
- 受診前の大気汚染物質濃度との関連を検討
 - 解析対象：粒子状物質($PM_{2.5}$)、二酸化窒素(NO_2)、オゾン(O_3)の日平均値
 - 気圧、湿度、気温、風速、日照時間の影響を考慮




PM_{2.5}濃度(日平均値)の推移



(Yamazaki, Shima, et al. Environ Health Pre Med, 2014)

喘息による受診と大気汚染物質 濃度の関連(複数汚染物質モデル)

2013年1～3月の3か月間




汚染物質 (増加単位)	受診当日		受診前日		受診前 3日平均	
	RR	95%CI	RR	95%CI	RR	95%CI
PM _{2.5} (10μg/m ³)	0.99	0.68-1.45	0.97	0.68-1.38	0.86	0.46-1.62
NO ₂ (10ppb)	2.87	0.83-9.90	1.91	0.68-5.40	2.27	0.63-8.24
O ₃ (10ppb)	1.36	0.64-2.88	2.31	1.16-4.61	3.98	1.28-12.38

大気中PM_{2.5}濃度と喘息による受診との関連はなかったが、
O₃濃度が増加すると喘息による受診の増加が認められた。

(Yamazaki, Shima, et al. Environ Health Pre Med, 2014)

おわりに



- 疫学研究の結果より、PM_{2.5}濃度と循環器・呼吸器系疾患等との関連性が示されている。
- 短期的影響は、呼吸器・循環器系疾患のある人では比較的低い濃度で認められているが、個人差が大きいと考えられる。
- 長期的影響は、かなり低い濃度でも生じる可能性が否定できず、集団としてのリスクの低減を図るために、大気環境の改善が望まれる。
- 大気汚染地域で生活する場合、日頃から大気汚染状況に留意し、高濃度となる際には不要不急の外出は控え、外出時にはマスクの装着、屋内では空気清浄機の使用などの対策が望ましい。